



تغذیه

در

بیماران دیالیزی

واحد تغذیه بیمارستان
سجادیه و مهر مادر تربت جام

کلسیم

در این بیماران به علت محدودیت مصرف منابع غنی کلسیم مانند شیر و لبنیات معمولاً مقدار مورد نیاز کلسیم از طریق غذا تامین نمیشود اما مصرف مکمل های داروئی کلسیم، می تواند این کمبود را جبران کند.

آب

با توجه به دفع محدود آب توسط کلیه در بیماران دیالیزی و احتمال تجمع مایعات در بدن آنها، لازم است مقدار آب و مایعات دریافتی بیمار به صورت دقیق محاسبه شود. معمولاً مقدار مایعات دریافتی بیمار بر اساس میزان حجم ادرار و میزان دفع نامحسوس مایعات (از طریق تنفس، تعرق و تب) تنظیم میشود.

رعایت نکات زیر میتواند در کنترل احساس تشنگی بیمار مفید باشد.

*اجتناب از مصرف غذاهایی که مقدار زیاد نمک در تهیه آنها به کار رفته است مثل پنیر شور، سوسیس، کالباس، همبرگر و غذاهای آماده کنسروی

*شستشوی دهان با آب و خودداری از فروبردن آب برای کاهش احساس تشنگی

استفاده از آدامس و آب نبات های سخت که باعث تحریک ترشح بزاق میشوند.

صرف یخ بعنوان بخشی از مایعات دریافتی (یخ مدت زمان بیشتری در دهان باقی مانده و میتواند احساس تشنگی را برطرف کند

فسفر

دفع فسفر در بیماران دیالیزی به خوبی صورت نمی گیرد و معمولاً این بیماران با مشکل افزایش فسفر خون مواجه هستند.

محدودیت یا **حذف** منابع غنی فسفر مانند فراورده های غذائی حاوی سبوس، نان های سبوس دار، حبوباتی چون لوپیا، عدس، لپه، نوشابه های گازدار، مغز پسته، بادام، گردو، فندق، بادام زمینی، دل و قلوه وجگر، شیر ماست، بستنی، پنیر، دوغ، شیر کاکائو، **حامه** می تواند به کنترل میزان فسفر خون این بیماران کمک کند.

چربی

توصیه میشود که بیماران دیالیزی از **روغن جامد**، **روغن حیوانی**، **گوشت ها و لبنیات پرچرب وجود دارد، استفاده نکنند**. سعی شود از روغن هایی مثل کلزا، سویا و زیتون که حاوی اسیدهای چرب مفید هستند استفاده نموده و در هنگام پخت غذا از حرارت کم استفاده شود.



پتاسیم

میوه ها و سبزی ها جزء منابع غنی از پتاسیم هستند در بیماران دیالیزی معمولاً تنظیم میزان دفع پتاسیم به خوبی صورت نمیگیرد معمولاً این بیماران دچار افزایش پتاسیم خون هستند، اما استفاده از سبزی هایی که پتاسیم کمتری دارند مانند **لوبیا سبز، خیار، شاهی، کاهو، فلفل سبز شیرین، کلم خام و همچنین میوه ها و فراورده هایی که پتاسیم کمتری دارند مثل آب انگور، گلابی، کمپوت گلابی، لیمو شیرین و لیمو ترش زرد در کاهش پتاسیم خون موثر است.**



بیماران دیالیز باید از مصرف میوه ها و سبزیجاتی که مقدار پتاسیم آن ها بالا است اجتناب کرده و یا فقط با نظر کارشناس تغذیه اقدام به مصرف آنها کنند.

میوه ها و سیزی هائی که پتاسیم آن ها بالا است عبارتند از:

اسفناج پخته . چغندر ، کرفس پخته ، قارچ پخته ، بامیه ، گوجه فرنگی ، سیب زمینی ، سس گوجه فرنگی ، فلفل تند ، خرما ، زرد آلو ، شلیل ، طالبی ، پرقال ، انجیر خشک ، کیوی ، گرمک ، خربزه و موز ، سبوس و جوانه حبوبات نیز حاوی پتاسیم زیاد هستند که مصرف آن ها باید محدود شود

استفاده از کمپوت میوه ها و خیساندن حبوبات

(آب آن دور ریخته شود) در کاهش پتاسیم دریافتی موثر است.

انرژی

بیماران دیالیزی نیازمند تامین انرژی به مقدار کافی هستند. استفاده از غذا به مقدار کافی به خصوص استفاده از گروه نان و غلات جهت تامین انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است.



پروتئین

بیماران دیالیزی به علت داشتن رژیم های غذائی محدود در دوره پیش از دیالیز به تامین مقدار بیشتری پروتئین نسبت به آن دوره نیاز دارند. البته تامین نیمی از پروتئین مورد نیاز از منابع با ارزش بیولوژیکی و با کیفیت بالا مانند تخم مرغ ، انواع گوشت های قرمز و سفید کم چرب مهم است.



سدیم

دفع سدیم در بیماران دیالیزی به طور کامل انجام نمی شود و تجمع سدیم در بدن باعث ایجا ورم ، فشارخون و در موارد شدید ایجاد نارسائی قلبی میشود . مصرف نکردن غذاهای حاوی نمک زیاد مثل انواع سوسیس ، کالباس ، چیپس و پنک و غذاهای آماده کنسروی و کنترل مصرف نمک طعام اهمیت دارد



نیازهای تغذیه ای بیماران:

بیماران دیالیزی مانند دیگر افراد برای رفع نیازهای حیاتی خود نیازمند مصرف غذا و تامین انرژی ، مواد معدنی و ویتامن ها هستند. با توجه به اینکه در این بیماران به علت نقص در کارکرد کلیه ها دفع آب و املahi چون سدیم ، پتاسیم و فسفر و... و مواد زائد حاصل از سوخت و ساز مواد غذائی به خصوص منابع غذائی حاوی پروتئین دچار اشکال میشود رعایت برخی نکات تغذیه ای جهت کمک به کارکرد کلیه و کاهش عوارض بیماری مهم است . رژیم غذائی در بیماران دیالیزی شامل رعایت نکات اساسی تغذیه مانند مصرف متعادل و متنوع انواع گروه های غذائی است که باید از نظر میزان انرژی،پروتئین و املاح مهمی چون سدیم ، پتاسیم و فسفر دقیقاً محاسبه شود .

نکته:

تنظیم رژیم غذایی و تامین ورفع نیاز بدن زیرنظر کارشناس تغذیه ورزیم درمانی انجام شود.