

داروهای کاهش دهنده قندخون اغلب به صورت قرص های خوراکی یا انسولین تزریقی می باشند و مصرف آن در زمان معین و به میزان مشخص لازم و ضروری و گاهی حیاتی است. نحوه دقیق مصرف دارو و شیوه صحیح تزریق را از پزشک یا پرستار جویا شوید.

عارض بلند مدت دیابت:

بیماری عروق بزرگ شامل: شریان کرونر، عروق مغزی و عروق محیطی .
بیماری عروق کوچک شامل کوری، از کار افتادن کلیه ها و اختلال در اعصاب، شامل: بی حسی، سوزن سوزن شدن، احساس سوزش اندام ها بخصوص در شب. تنظیم دقیق قند خون عوارض بلند مدت را با میزان زیادی کاهش می دهد. انجام معاینه چشم (جهت تشخیص عارضه در مراحل اولیه) حداقل به صورت سالیانه ضروری می باشد. دیابت یکی از مهمترین علل نایابنایی، قطع عضو و از کار افتادن کلیه ها است. که قابل پیشگیری می باشد.

مشکلات پا در دیابتی ها:

دیابت باعث از بین رفتن حس درد، نارسایی گردش خون در اندام ها و سرکوب سیستم ایمنی می گردد. که همه این مشکلات باعث خشک شدن و ایجاد ترک در پوست پا، از بین رفتن حساسیت نسبت به صدمات ناشی از آسیب های حرارتی مثل آب داغ، شیمیایی مثل شوینده ها، ضربه ای و فشاری مثل کفش و جوارب تنگ و نامناسب، راه رفتن روی اشیا تیز و برقنه و ناخن گیر می شود. داشتن ترشح، تورم، قرمزی و یا کبود شدن ممکن است اولین علامت و نشانه مشکلات پا باشد که توجه به آن ضروری می باشد. درمان زخم های پا شامل استراحت در تخت، آنتی بیوتیک و برداشت بافت های مرده می باشد. به علاوه کنترل کردن سطح قند خون، که در زمان عفونت بالا می رود برای پیشبرد بهبودی و ترمیم زخم ضروری می باشد گاهی جهت پیشگیری از گسترش عفونت قطع عضو ضروری می باشد.

آموزش مراقبت از پا:

هر روز باید پاهای خود از نظر وجود بریدگی، تاول، لکه های قرمز، سیاه و ورم چک کنید. اگر در دیدن کف پای خود مشکل دارید از آینه استفاده کنید یا از یکی از اعضا خانواده کمک بگیرید. هر روز پاهای خود را بشویید(با آب گرم نه داغ(برای بررسی میزان حرارت اب، ارنج خود را زیر آب بگیرید. بخوبی پاهای را خشک کنید حتی بین انگشتان پا پوشش نازکی از کرم پوستی روی تمام قسمت های پا به جز بین انگشتان بمالید. از سنگ پا جهت صاف کردن پینه ها و میخچه ها استفاده نکنید. ناخن های پا را بصورت مستقیم بچینید و لبه های نازک و تیز آن را سوهان بزنید. در تمام اوقات جوراب و کفش بپوشید و هرگز پا بر هنره راه نروید. در انتخاب کفش دقت کنید کفشی بپوشید که کامل اندازه بوده و پاهایتان را محافظت کنند. همیشه قبل از پوشیدن کفش داخل آن را بررسی کنید(لایه های آن سالم باشد و اشیاء خارجی داخل آن نباشد). پاهای را از سرما و گرمای محافظت کنید.

در ساحل و داخل حمام و سونا و... کفش بپوشید. در صورت سرد شدن پا در شب جوراب بپوشید. هنگام نشستن بر روی صندلی پاهای خود را بالاتر قرار دهید. انگشتان و مچ پای خود را به بالا و پایین برای مدت ۵ دقیقه تکان دهید این کار را دو تا سه بار در روز تکرار کنید. برای مدت طولانی پاهای خود را روی هم نینهاریزید. سیگار نکشید. در صورت وجود بریدگی، زخم، تاول یا خراشیدگی روی پاهای که در طی چند روز شروع به ترمیم و بهبودی نکند، به دکتر خود اطلاع دهید. بطور مرتبت تحت نظر کلینیک مشاوره یا پزشک قرار بگیرید.

در صورت داشتن هرگونه مشکل با شماره های زیر

تماس بگیرید:

۰۵۱۵۲۵۲۱۸۱۱

صبح داخلی ۳۲۲ و عصر و شب داخلی ۲۳۰-۲۳۵

HTTP://www.trjums.ac.ir



دانشکده علوم پزشکی تربت جام
بیمارستان سجادیه

آموزش به بیمار

دیابت



واحد آموزش سلامت همگانی

SH:PEU-BK-63

1400-1401

انسولین

اصول ورزش:

ورزش در درمان دیابت فوق العاده مهم می باشد ورزش باعث مصرف بهتر انسولین توسط سلول ها و در نتیجه تنظیم قند خون و کاهش بیماریهای قلبی و عروقی می شود بیماری که به انسولین نیاز دارد قبل از شرکت در تمرینات ورزشی متوسط، جهت پیشگیری از کاهش قند خون باید یک وعده غذایی، کوچک (دسرمختصر) یا معادل آن میوه بخورد.

ورزش اگر باعث کاهش وزن شود، موجب افزایش حساسیت به انسولین می شود شاید میزان نیاز به انسولین یا داروهای خوارکی را کاهش می دهد. بیماران دیابتی باید هر روز در یک زمان (ترجیحاً زمانی که سطح قند خون در بالاترین مقدار می باشد) و به یک اندازه ورزش کنند. از ورزش کردن در هوای خیلی گرم یا سرد خودداری شود. از کش مناسب و سایر وسایل محافظتی استفاده و بعد از ورزش کردن پاها بررسی و مشاهده شود بخارتر داشته باشید ورزش سنگین و فعالیت شدید می تواند موجب افت خطرناک قندخون شود. پاییز و کنترل قند خون: قند خون را توسط دستگاه گلوكومتر و طبق نظر پزشک اندازه گیری کنید به علائم کاهش و افزایش قند خون توجه کنید علائم کاهش قند خون شامل تعريق بیش از حد، تپش قلب، احساس گرسنگی و ضعف عمومی، تحریک پذیری، بی حس شدن اندامها میباشد.

درمان آن شامل :

خوردن ۳-۴ جبه قند، یا ۲-۳ قاشق عسل یا نوشیدن نصف لیوان آب میوه بدون شکر، و بعد از بھبود علائم یک ساندویچ کوچک یا میان وعده استفاده شود. علائم افزایش قند خون قبل اشاره شد(علائم اصلی دیابت). در نظر داشته باشید افزایش ناکهنه ای قند خون موجب دفع شدید مایعات بدن و کاهش یا از دست دادن هوشیاری و حتی مرگ می شود.

پرادراری، پراشتھایی، پرنوشی. علائم دیگر شامل: خستگی و ضعف، تغییر ناگهانی خلق و خوی بیمار، گز گز و بی حسی دستها یا پاها، خشکی پوست، زخمها ی که به کندی بھبود می باند، و عفونتها عود کننده می باشد. دیابت نوع ۱ ممکن است با تهوع و استفراغ یا دردهای شدید شکمی همراه باشد.

هدف اصلی از درمان دیابت، تنظیم سطح قند خون جهت کم کردن توسعه عوارض عروقی و عصبی در دراز مدت می باشد. درمان دیابت دارای پنج محور اساسی می باشد: رژیم غذایی، ورزش، پایش و کنترل قند خون، دارو درمانی.

آموزش رژیم غذایی و کنترل وزن اساس درمان دیابت را تشکیل می دهند. باید تمامی ترکیبات غذایی ضروری مثل ویتامینها و مواد معدنی در رژیم غذایی باشد. نگهداری وزن در حد مطلوب و برآوردن انرژی مورد نیاز، تنظیم سطح قند خون و کم کردن سطح چربی سرمه در یک رژیم غذایی متناسب باید مد نظر قرار گرفته شود و دریافت غذا باید به چند وعده (اصلی و میان وعده تقسیم شوند).

نکته:

در بیماران چاق (بخصوص دیابت نوع ۲) کاهش وزن کلید درمان دیابت می باشد. بیماران دیابتی لازم است در صورت مصرف مشروبات الکلی را به طور کامل قطع کنند.

اصول تعذیه درمانی:

غذاهای نشاسته ای را با غذاهای حاوی پروتئین و چربی ترکیب کنید زیرا باعث کند کردن جذب قند می شود انواع سبزیجات، میوه جات (خام و پخته) و حبوبات را در رژیم غذایی خود بگنجانید. از مصرف غذاهای چرب اجتناب کنید، غذاهایی که بر چسب، بدون قندی، بی قنددارند ممکن است همچنان کالری هایی مساوی با محصولات قند دار داشته باشند. پس برای کاهش وزن این محصولات مفید نیستند. غذاهایی که دارای برچسب [رژیمی] هستند حتماً غذاهایی کم کالری نیستند. برچسب (غذاهای بهداشتی) (را بخوانید، چون اغلب حاوی محصولات قندی از قبیل عسل و شکر می باشند حتماً از راهنمایی های ارزنده کارشناسان تعذیه کلینیک مشاوره دیابت استفاده کنید.

هورمونی است که توسط پانکراس (لوزالمعده) ترشح می شود و نقش آن تنظیم میزان قند خون می باشد. قند خون طبیعی در حالت ناشتا بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر است. اگر بیشتر از این محدود باشد با انجام آزمایش های تخصصی تر دیابت تشخیص داده می شود.

طبقه بندی دیابت:

دیابت نوع ۱: ۵٪ موارد بیماری را تشکیل می دهد. شروع این نوع دیابت در هر زمان امکانپذیر می باشد اما بیشتر جوانان را در سنین پایین مبتلا می سازد علت ابتلا، عدم ترشح انسولین بوده و مبتلایان به مصرف انسولین در این گروه ضروری است.

دیابت نوع ۲: ۹۰-۹۵٪ از موارد شامل شده و شروع آن بالای ۳۰ سالگی است علت بروز آن، کاهش ترشح یا کاهش حساسیت سلولها نسبت به انسولین می باشد.

دیابت زمان حاملگی

دیابت همراه با سایر بیماریها

علایم اصلی دیابت :

