




دانشگاه علوم پزشکی تربت جام
بیمارستان سجادیه

آموزش به بیمار

فیبریلاسیون دهلیزی



واحد آموزش سلامت همگانی
SH:PEU-BK-38
۱۴۰۱-۱۴۰۲

اگر دچار هرگونه خونریزی یا کبود شدگی غیر طبیعی
یا سایر مشکلات شدیدفورا با پزشک خود مشورت
کنید.



اگر قرص وارفارین مصرف میکنید در فواصل زمانی که
پزشکان آن را تعیین می نمید آزمایش **PT-INR** بدهید
این فواصل نباید بیشتر از یک ماه باشد.



در صورت داشتن هرگونه مشکل
با شماره های زیر تماس بگیرید:
۰۵۱۵۲۵۲۱۸۱۱
صبح داخلی ۰۷۱ و عصر و شب
داخلی ۲۶۰

چگونه میتوان خطر سکته مغزی را
کاهش داد؟

ممکن است پزشک شما
داروهایی را جهت
پیشگیری از ایجاد لخته
خون برای شما تجویز
نماید.

دونمونه از این داروها
داروهای ضد انعقاد و ضد
پلاکت مانند وارفارین
و آسپرین می باشد.

همواره به پزشک و
دنданپزشک و داروساز
خود بگویید که از وارفارین
و یا آسپرین استفاده
میکنید.



فیبریلاسیون دهليزی چیست؟

در شرایط طبیعی قلب با ضربان منظمی دچار انقباض شده و سپس شل میشود برخی از سلول های قلب پیامهای الکتریکی ایجاد می کنند که سبب انقباض قلب و پمپ خون می شود. پژوهش شما نوار قلب شما را خوانده و مشخص می کند آیا پیامهای الکتریکی قلب شما طبیعی هستند یا خیر؟

علایم فیبریلاسیون دهليزی:

۱. ضربان سریع و نامنظم
۲. تپش قلب یا احساس ضربه سریع در داخل قفسه سینه
۳. سرگیجه - تعریق و درد یا فشار در قفسه سینه
۴. تنگی نفس یا اضطراب
۵. خستگی زودرس
۶. غش کردن و سنکوپ



در فیبریلاسیون دهليزی دو حفره‌ی بالای قلب (دهليزها) فاقد ضربان مطلوب می‌باشند به جای ضربان منظم و الگوی طبیعی دهليزها به شکل غیر منظم و تند منقبض می‌شوند پمپ کردن مناسب خون توسط قلب نیازهای اکسیژن و تغذیه‌ای بدن تأمین می‌شود. شما ممکن است توانید با فیبریلاسیون دهليزی زندگی کنید اما این مشکل منجر به سایر مشکلات ریتم قلبی خستگی مزمن - نارسایی قلبی و بدتر از همه افزایش احتمال سکته مغزی می‌شود. جهت کنترل این مشکل مراجعه منظم به پزشک ضروری می‌باشد.

