



دانشگاه علوم پزشکی تربیت جام
بیمارستان سجادیه

راهنمای مصرف داروها در آزمایشات خاص

*در صورتی که جهت دادن نمونه در ساعات اولیه صبح مراجعه خواهید کرد داروهای خود را بعد از دادن نمونه میل نمایید ولی برخی آزمایشات نیاز به زمان خاص دارند که در ذیل اشاره می شود:

*برای ارزیابی آزمایشات انعقادی مطلوب است بیمار یک ساعت قبل از خوردن داروهای مربوطه (به جز موارد اورژانس) مراجعه نماید.

برای سنجش سطح خونی داروها (TDM) به نکات زیر توجه فرمایید:

lithium - (لیتیم) : بیمار ۷ روز دارو مصرف کرده باشد و ۱۲ ساعت پس از دوز شبانه دارو برای نمونه گیری مراجعه نماید

cabamazepin (کاربامازپین) : بیمار حداقل یک هفته دارو مصرف کرده باشد و پس از مصرف آخرین مقدار دارویی به آزمایشگاه برای نمونه گیری مراجعه کند.

digoxin (دیگوکسین) : بیمار بیش از یک ماه دارو مصرف کرده باشد و پس از حداقل ۸ تا ۱۲ ساعت از مصرف آخرین دوز دارویی به آزمایشگاه مراجعه نماید.

phenitoein (فنی توئین) : بیمار از یک هفته قبل دارو مصرف کرده باشد و پس از این مدت می تواند به آزمایشگاه مراجعه کند.

- **phenobarbital** (فنوباربیتال) : کودکان از ۱۵ روز و بزرگسالان از ۲۵ روز پس از مصرف دارو برای سنجش سطح خونی دارو به آزمایشگاه مراجعه نمایند.

valporic acid (اسید والپوریک) : بیمار حداقل ۳ روز دارو مصرف کرده باشد و نمونه گیری پیش از آخرین دوز دارویی انجام می گیرد.

- **teophilin** (تئوفیلین) : کودکان ۲ تا ۵ روز و بزرگسالان حدود ۳ روز از مصرف دارویی آن ها گذشته باشد و نمونه گیری قبل از آخرین دوز دارویی انجام شود.

- **pyrimidine** (پیریمیدون) : بیمار حدود ۲ روز دارو مصرف کرده باشد و قبل از آخرین دوز دارویی به آزمایشگاه برای نمونه گیری مراجعه نماید.

- **pyrimidine** (پیریمیدون) : بیمار حدود ۲ روز دارو مصرف کرده باشد و قبل از آخرین دوز دارویی به آزمایشگاه برای نمونه گیری مراجعه نماید.

cyclosporine (سیکلوسپورین) : برای اندازه گیری دقیقاً ۲ ساعت پس از آخرین دوز به آزمایشگاه مراجعه نماید.